

# Produits phytopharmaceutiques agréés en prairies

F. Henriët et B. Weickmans, CRA-W Gembloux



Matières actives utilisables en prairies	Spécialités commerciales	Formulations	Contre	Autres usages	Remarques (usage "prairies" uniquement)
2,4-D	Plus. produits	SL 500 g/L	Dicots	1	DAF: 7 j.
2,4-D + MCPA	Plus. produits	3 formulations	Dicots	1*	DAF: 7 j.
Asulam	Plus. produits	SL 400 g/L	Fougères		au printemps, DAF: 7 j.
Bentazone	Plus. produits	2 formulations	Dicots an.	2	au printemps, DAF: 7 j., max. 1 app./an
Dicamba	Plus. produits	SL 480 g/L	Dicots	7	DAF: 7 j.
Diquat	Reglone	SL 200 g/L	R et R	7, 8	DAF: 10 j.
+ paraquat	Priglone	SL 120+80 g/L	R et R	8	DAF: 10 j., max 2 app./an
Ethofumesate	Plus. produits	2 formulations	Gram.	5	en oct-nov ou fev-mars, DAF: 14 j.
Florasulam	Primus	SC 50 g/L	Dicots	2	au printemps, max 1 app./an
Fluroxypyr	Plus. produits	EC 180 g/L	Dicots	4	DAF: 7 j.
+ florasulam	Primstar	SE 100+2,5 g/L	Dicots	2	DAF: 14 j., max 1 app./an
+ triclopyr	Silvanet	EC 20+60 g/L	Dicots	7	DAF: 14 j., en localisé
+ clopyralide + ioxynil	Starane Kombi	EC 100+30+120 g/L	Dicots	7	au printemps, DAF: 8 j.
+ clopyralide + MCPA	Plus. produits	EW 40+20+200 g/L	Dicots		au printemps, DAF: 7 j.
Glyphosate	Plus. produits	4 formulations	R et R	7, 8*	DAF: 5 j.
Isoxaben	AZ500	SC 500 g/L	Nv. S		juste après le semis
MCPA	Plus. produits	3 formulations	Dicots	1, 8*	DAF: 7 j.
MCPB	Plus. produits	SL 400 g/L	Dicots#	8	au printemps, DAF: 7 j.
Mecoprop-p	Plus. produits	2 formulations	Dicots	1*	DAF: 7 j.
+ dichlorprop + MCPA	Gramix Extra	SL 135+340+150 g/L	Dicots		DAF: 7 j.
Metsulfuron	Allié	SG 20 %	Dicots		@, DAF: 14 j., max 1 app./an
Thifensulfuron	Harmony Pasture	WG 75 %	Dicots#		@, DAF: 28 j., max 1 app./an
Triclopyr	Plus. produits	2 formulations	Ligneux	8	DAF: 14 j., max 1 app./an, en localisé

## Autres matières actives

utiles pour l'éleveur et le multiplicateur de semences	Spécialités commerciales	Formulations	Contre	Usages	Remarques
Carbetamide	Plus. produits	EC 300 g/L	Gram.	3	fin hiver ou début print., max 1 app./an
Chlorprophame	Plus. produits	EC 400 g/L	Gram. + dicots	3, 6	en post-émergence
Cycloxydime	Focus Plus	EC 100 g/L	Gram.	3, 6	56 jours de délai avant récolte
Fluazifop	Fusilade	EC 250 g/L	Gram.	3, 6	28 jours de délai avant récolte
Glufosinate-ammonium	Plus. produits	SL 150 g/L	R et R	7, 8	herbicide total
Methabenzthiazuron	Sniper	WP 70 %	Gram.	2	en post-émergence
Paraquat	Plus. produits	SL 200 g/L	R et R	3, 6, 7, 8	herbicide total
Propyzamide	Kerb 50	WP 50 %	Gram. + dicots	3	en fin d'automne

### Les différents usages:

1. Culture de graminées
2. Culture de graminées (prod. de semences)
3. Luzerne
4. Ray-grass
5. Ray-grass anglais et d'Italie (prod. sem.)
6. Trèfle
7. Terres agricoles en interculture (traitement généralisé)
8. Usages non liés à une culture particulière (traitement localisé)

### Abréviations et remarques

R et R: pour refus et renouvellement de prairies.

Nv. S: pour nouveaux semis.

DAF: délai avant fauchage ou pâturage.

#. sélectif des trèfles.

\*: en fonction du produit l'usage peut être différent.

@: au printemps, pour une prairie d'au moins 6 mois.

Les doses d'emploi ne sont pas détaillées car elles peuvent varier en fonction de l'usage qui est fait du produit.

Lire l'étiquette constitue un préalable avant l'application de tout produit !!

Traiter avant la floraison des adventices pour la protection des abeilles.

Des informations plus complètes à propos de l'agrément des produits sont disponibles sur le site internet <http://www.phytoweb.fgov.be>